

ՀՈՐԹԵՐԻ ՄԿԵԱՏԱՄԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

Մկնապահանքը սնկային վարակիչ հիվանդություն է, որը կենդանուց անցնում է նաև մարդուն, այդ իսկ պարճառով անհրաժեշտ է ժամանակին վակցինացնել կենդանիներին:

Նարուցիչը կարող է լինել գրեթե ամենուր՝ ծղոյրում, գոմաղբում, անասնաշենքերում, կրծողների վրա և այլն: Բավական կայուն է փարբեր բացասական գործոնների նկատմամբ:

- անասնաշենքում և հարակից փարածքներում կարող է պահպանվել 6-8 փարի
- վարակված մաշկի վրա՝ 4-7 փարի
- գոմաղբում և գոմաղբահեղուկում՝ 3-8 ամիս
- վարակված կերի մեջ՝ 4-8 փարի

Մակայն անկայուն է արևի ուղիղ ճառագայթների նկատմամբ՝ ոչնչանում է 1 ժամից:

Ներկաբար պետք է ապահովել արևի ճառագայթների մուտքը դեպի անասնաշենք:

Հիվանդությունն առկա է փարվա ցանկացած եղանակներին, բայց առավել հաճախ՝ ձմռան-գարնան ամիսներին



Ցանկացած հասակային խմբի ԽՇԿ ընկալունակ է մկնապահի նկատմամբ, սակայն առավել հաճախ և ծանր ձևերով հիվանդանում են 2 ամսականից մինչև 1 փարեկան հորթերը:

Կլինիկական նշանները, որոնք հիմնականում ի հայտ են գալիս կենդանու բերանի, աչքերի, ճակարի, պարանոցի, մեջքի հարվածներում, նկատվում են մազաթափված կամ մազերը հիմքից կոտրված, վերքանման, թեփակալված, կեղակալված, երբեմն էլ թարախակալված խոցային մակերեսների փեսքով, որոնք սկզբում լինում են փոքր, բայց ասփիճանաբար միանալով իրար, ախտահարում են մեծ մակերեսներ:

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆԱՄԱՐ ՊԵՏՔ Է

- 14 օրական հասակից սկսած վակցինացնել հորթերին **ԼՏՖ-130 վակցինայով**
- անասնաշենքերում ապահովել արևի մշտական մուտքը
- որպես ցամքար օգտագործվող ծղոյրը բերել ապահով վայրերից
- փարեկան գոնե 2 անգամ անցկացնել **գոմերի ախտահանում**
- պայքարել կրծողների դեմ



ԼՏՖ-130 վակցինան օժտված է բարձր իմունաձնությամբ և բուժիչ հատկությամբ: Ամենածանր ախտահարման դեպքում էլ կենդանու մոտ 3-րդ ներարկումից հետո արդեն ի հայտ են գալիս առողջացման նշանները:

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Cooperation Office
South Caucasus

 SDA Strategic Development Agency
Strategies for Development